*FAS*Test® FeLV-FIV ad us. vet.

La infección viral en gatos mundialmente más común

Test rápido para la detección cualitativa de antígenos del virus de la leucemia felina (FeLV) así como anticuerpos del virus de la inmunodeficiencia felina (FIV) en sangre, plasma o suero del gato

Diagnóstico rápido y fiable

FeLV: detección del **antígeno** etiológico, en caso p. ej., de inmunosupresión, infecciones de todo tipo, tumores

FIV: detección de **anticuerpos** en caso p. ej., de inmunosupresión, linfadenitis, todo tipo de inflamaciones crónicas o recidivantes, anemias

Diagnóstico de exclusión de FeLV o FIV
en caso de sintomatología clínica inespecífica

Revisión anual
- Test rutinario previo la vacunación frente a FeLV/ FIV
- Determinación del estatus de FeLV/ FIV

Test rutinario de grupos en riesgo
- Nuevas incorporaciones de orígen desconocido
- Hogares con múltiples gatos no controlados
- Gatos callejeros, o gatos con libre acceso al exterior

- Fácil análisis en sangre, plasma o suero
- Rápida interpretación del resultado después de 10 minutos
- Diagnóstico clínico fiable
- FeLV: Sensibilidad 95,0 % y especificidad 99,9 %
  FIV: Sensibilidad 96,4 % y especificidad 99,2 %
- Conservación a temperatura ambiente (15–25 °C)
- Larga vida útil
- Caja de tests compacta con 2, 6, 15, 25 o 50 tests

*FAS*Test® FeLV-FIV ad us. vet.

El virus de la leucemia felina (FeLV) así como el virus de la inmunodeficiencia felina (FIV) se encuentran mundialmente en los félidos. Las prevalencias en Europa varían entre un 2 % (FeLV) y un 2–3 % (FIV).

Ambos causan un cuadro clínico muy parecido en los gatos infectados, debido a su carácter inmunosupresor. La detección del antígeno del FeLV o la detección de anticuerpos contra FIV es un método diagnóstico de elección de una infección por FeLV o FIV.

Los gatos infectados por FeLV virémicos muestran, por lo general a partir de las 3 semanas post infección, altas concentraciones de antígenos extracelulares (libres). Aprox. 95 % de los gatos infectados por FIV muestran por lo general a partir de las 4 semanas post infección altas concentraciones de anticuerpos contra FIV en la sangre.

Basado en anticuerpos altamente específicos monoclonales y proteínas recombinantes de FIV, el ***FAS*test® FeLV-FIV** es un importante método diagnóstico para la evaluación del estado de FeLV y/o FIV de gatos sospechosos.

Procedimiento



Interpretación



Se recomienda ***FAS*test® FeLV** en caso de análisis simple previo a la vacunación frente a FeLV.
Se recomienda ***FAS*test® FIV** en caso de análisis simple previo a la vacunación frente a FIV.

ES 10-2019
nº de autorización 1391-RD (España) / nº de registro RIP-KD-19 (Ecuador)

Distribución:
DiagnoVet
Laboratorio Clínico Veterinario
Av. Lorenzo de Garaycoa 2511 y Cuenca
Guayaquil - Ecuador
+593-9-87294553 / +593-9-39419696
www.diagnovet.com.ec